

## **МКБ X Дисциркуляция в ВББ**

Больные, обычно рассматриваемые врачами, как дисциркуляция в ВББ или дисциркуляторная энцефалопатия в ВББ при кодировке согласно МКБ 10 будут разделяться на следующие категории

1. - **Код: I67.8 Другие уточненные поражения сосудов головного мозга**  
- **Клинич.диагноз - Дисциркуляторная энцефалопатия, дисциркуляция в ВББ**  
Это лица с убедительными признаками страдания позвоночных артерий: деформации остеофитами, петли, сдавление мышцами, мембранами, септальные стенозы и т.д.

При этом клинические проявления носят постоянный характер, а причиной госпитализации служит декомпенсация общих проявлений: слабость, тревожность, «туман» в глазах, дрожание, чувство дурноты.

2. - **Код G45.0 Вертебробазилярный артериальный синдром**  
- **Клинич. диагноз ПНМК (ТИА) в вертебробазилярной системе**

Устанавливается при наличии эпизода (объективно зарегистрированного или анамнестически):

1. косоглазия (двоения), прозопареза, бульбарных проявлений, альтернации, гемианопсии
2. четкого эпизода вестибулярного головокружения, проявляющегося латерализованным нистагмом

3. - **I67.4 Гипертензивная энцефалопатия**  
- **Клинич.диагноз - дисциркуляция в ВББ**

Острый эпизод сосудистый эпизод с ощущением недомогания, тошноты, общей неустойчивости (невестибулярные головокружения), реализующийся, как правило, на фоне артериальной гипертензии.

4. - **Код M54.2 Цервикалгия**  
- **Клинич.диагноз - Цервикалгия, цервико-краниалгия**

Лица у которых ведущим является алгический синдром в области надплечий и затылка преимущественно миофасциального генеза, без убедительных радикулопатий. При этом может присутствовать дополнительное ощущение легкой дурноты, неустойчивости и т.д.

5. - **Код M53.0 Шейно-черепной синдром**  
- **Клинич.диагноз Цервико-краниалгия, миофасциальный синдром надплечий с отраженными цефалгиями, (устар. Синдром позвон.артерии, задне-шейный симпатический синдром)**

Лица с доминированием краниалгического компонента, тяжесть в затылке и надплечьях, боль в висках, лобной области, глазах, позиционное головокружение из-за миофасциального синдрома в кивательной мышце

**Примечание. Пациентами РСЦ из данных 5 групп могут быть лишь ситуации 2 пункта, шифруемые как G45.0**